


استخدام جهاز الاستنشاق فقط




يمكن أن تبخ أجهزة الاستنشاق بالمزوّدة بمقياس للجر عات الدواء بسر عة تصل إلى 60 ميلاً في الساعة، مما يتسبب في اصطدام الدواء بمؤخرة الحلق أو سقف فمك.

نصائح التدبير العلاجي لمرض الربو

تعرّف على المزيد من نصائح التدبير العلاجي لمرض الربو من خلال برنامج Asthma Basics التابع للربو من خلال برنامج American Lung Association. يعلّم هذا البرنامج التعليمي التفاعلي عبر الإنترنت، والذي تبلغ مدته ساعة واحدة، المشاركين كيفية التعرّف على مسببات الربو وإدارتها، ومعرفة قيمة خطة علاج الربو، والتعرّف على حالات طوارئ التنفسية وطريقة الاستجابة لها.

Lung.org/asthma-basics

استخدام جهاز الاستنشاق باستخدام أداة مباعدة أو أنبوب مباعدة بصمام (VHC)



بمجرد توصيل أنبوب المباعدة بصمام أو أداة المباعدة بجهاز الاستنشاق المزوّد بمقياس للجرعات، يمكنك:

- المساعدة في جعل الدواء يتجاوز فمك وحلقك والوصول إلى رئتيك
 حيث يتمكن من بدأ مفعوله
 - تجنب مشاكل البخ والتنفس في الوقت نفسه
 - تفادي استنشاق الدواء بسرعة كبيرة
 - جعل عملية تناول الدواء أسهل عندما الإصابة بأعراض الربو