

Conozca la diferencia entre sus medicamentos para el asma

*Los medicamentos genéricos también están disponibles.
Esta información también está disponible en español y criollo haitiano.*

Ejemplos de Medicamentos de alivio rápido (rescate)

(broncodilatadores agonistas beta de acción corta)



Ejemplos de Medicamentos para el control a largo plazo

(corticosteroides inhalados)



Medicamentos de alivio rápido (rescate):

- Detienen los síntomas de asma una vez que estos comienzan.
- Relajan los músculos que se tensan alrededor de las vías respiratorias.
- Pueden utilizarse antes de hacer ejercicio para ayudar a prevenir los síntomas.
- El efecto dura hasta cuatro horas.

Medicamentos para el control a largo plazo:

- Se toman diariamente, incluso cuando se siente bien.
- Reducen la inflamación en las vías respiratorias.
- NO alivian los síntomas de asma durante un ataque.

En el condado de Suffolk de Nueva York, más de 43,000 niños (hasta 17 años de edad) y más de 173,400 adultos (desde 18 años de edad) tienen un diagnóstico de asma.¹

Ejemplos de Medicamentos para el control a largo plazo

(medicamentos combinados con corticoides inhalados y broncodilatadores agonistas beta de acción prolongada)



Hable con su farmacéutico sobre sus medicamentos.

Todos los inhaladores de dosis medidas deben utilizarse con un espaciador. Hable con su proveedor para saber cómo obtener y usar un espaciador.

¹ Department of Health, N.Y.S. (mayo de 2018). Information on Asthma in New York State. Recuperado de health.ny.gov/statistics/ny_asthma